



savvycheck™

בדיקה עצמית לאבחון פטרת הנרתיק



שירות לקוחות ותמיכה | خدمة العملاء والدعم  
Обслуживание и поддержка клиентов

ימים א'-ה' 08:00-17:00

savvycheck™

בדיקה עצמית לאבחון פטרת הנרתיק

• בדיקה נוחה וקלה לשימוש

• תוצאות תוך 10 דקות בלבד

• רמת אמינות גבוהה

• ניתנת לביצוע בכל שעה משעות היום

• מונעת שימוש מיותר בחומרים אנטי-

פטרייתים

תרגישו בנוח להיבדק מהבית

savvycheck™

בדיקה עצמית לאבחון קנדידה

מתוצרת חברת

סביון דיאגנוסטיקה

הדרך הקלה והנכונה ביותר לזיהוי

מדויק של פטרת הנרתיק


☎ 1800-071-440

[www.savvycheck.com](http://www.savvycheck.com)



## הבדיקה מבוצעת בארבעה שלבים פשוטים:

1. דגמי מהנרתיק דגימה בעזרת המטוש המצורף בערכה



2. הכניסי את המטוש לנוזל בתוך המכסה הסגול למשך 20 שניות



3. סובבי את המכסה הסגול לכיוון החץ והמתיני כ-10 דקות



4. קראי את התוצאות



T=Test C=Control

## מדוע כדאי לבצע בדיקה לפטרת הנרתיק?

נשים רבות מעדיפות לרכוש את הטיפול בפטרייה ללא בדיקה או התייעצות עם רופא ובהסתמך על הסימפטומים המוכרים, אך 50% מהנשים טועות בזיהוי ונטולות את הטיפול הלא נכון.

זיהוי לא נכון ושימוש בתכשירים שלא לצורך גורם לעיכוב בטיפול כנגד הגורם האמיתי לבעיה. שימוש תדיר בחומרים אנטי-פטריתיים עלול לגרום לגרד ואדמומיות וכן להתרבות של זנים עמידים, בדומה לשימוש שלא לצורך באנטיביוטיקה.

## למה כדאי לבצע בדיקה ביתית?

Savvycheck – בדיקה עצמית לזיהוי פטרייה נרתיק מסוג קנדידה, תחסוך את הזמן והמאמץ הכרוך בללכת לבדיקה אצל הגניקולוג. הבדיקה הינה קלה, אמينة, נוחה לשימוש ואורכת 10 דקות בלבד.



## מהי פטרת הנרתיק?

פטרת וגינאלית נובעת מהתרבות של פטריית הקנדידה בנרתיק. פטריית הקנדידה נמצאת באופן רגיל בנרתיק כחלק מה "פלורה" הטבעית ואיננה גורמת להפרעה כלשהי. התרבות של פטריית הקנדידה היא הגורם לסימפטומים המזוהים עם פטרת וגינאלית. תופעה זו היא נפוצה ביותר, 75% מהנשים יחוו לפחות פעם אחת בחייהן התרבות של הפטרייה בנרתיק, ומחצית מהן יחוו את התופעה בפעם השנייה.

## מה הם הגורמים לפטרת הנרתיק?

גורמים היכולים להגביר את הסיכוי להתרבות של פטריית הקנדידה הם: שימוש בגלולות למניעת הריון, אמצעי מניעה שונים (דיאפרגמה, קוטלי זרע), ומצבים בריאותיים כמו סוכרת, הריון, מערכת חיסון חלשה ושימוש באנטיביוטיקה הגורמת לשינוי בפלורה הטבעית של הנרתיק. כמו כן, חוסר שינה, לחץ נפשי והרגלי אכילה לא נכונים.

## מה הם הסימפטומים המאפיינים את התרבות הפטרייה?

הסימפטומים המאפיינים את התרבות הפטרייה הם: גרד, הפרשה לבנה, צריבה, פריחה וצריבה מוגברת בזמן מתן שתן.



savvycheck™